

Emergenza COVID - Situazione Attuale[†]

Aggiornato al 25 Marzo 2020

Francesco Furno[‡]

1 Riassunto Punti Principali


1. I dati giornalieri devono essere filtrati dalla volatilità giornaliera per poterne estrarre un **trend** piu' facilmente interpretabile.
2. Rallentamento della **crescita giornaliera di casi, decessi, e ricoveri (TI e non)** in atto da giorni. Il trend sta diventando uniforme tra regioni. Estrapolando il trend, la crescita dei casi dovrebbe fermarsi tra circa 10 giorni.
3. **Tamponi totali** in costante aumento, ma **propensione a eseguire tamponi** in calo in tutte le regioni, misurata come tamponi totali su casi totali regione per regione. Questo riflette sia la difficoltà del sistema sanitario di stare al passo con l'epidemia sia un cambiamento di strategia. 1 test su 4 è attualmente positivo al COVID, rispetto a 1 test ogni 12 del 1 Marzo scorso.
4. **Tassi di letalità** molto eterogenei tra regioni e particolarmente alti. Stimo il tasso di letalità comparando i decessi ad oggi con i casi totali a 6 giorni fa. Calcolare il tasso di letalità dividendo i decessi totali ad oggi per i casi totali oggi produce una stima errata durante l'epidemia, come spiegato in questo studio epidemiologico: <https://academic.oup.com/aje/article/162/5/479/82647>.
5. Gli **alti tassi di letalità italiani** ("l'anomalia Italia") possono essere spiegati da bassa propensione a testare: regioni con maggiore propensione a testare registrano tassi di letalità inferiori. Le regioni con piu' bassa propensione a testare sono quelle con un maggior numero di casi.
6. Possibile stimare i **casi effettivi** comparando il tasso di letalità nei dati italiani con quello 'teorico' di Cina e Ferguson et al: i casi effettivi sono tra 510 mila e i 850 mila ad oggi. Questo significa che i casi rilevati sono solamente tra il 10% e il 20% del totale effettivo. Forti differenze tra regioni.
7. Importante riportare i casi alla popolazione a livello regionale: in Lombardia, tra il 2,7% e il 4,5% della popolazione è probabilmente infetta, ma anche nelle Marche il tasso varia dallo 1,1% al 1,9% come risultato di una popolazione inferiore. Importante monitorare le regioni piu' piccole, anche se il numero totale dei casi è inferiore.
8. Sulla base dei casi *ad oggi*, è previsto il raggiungimento di 13000 decessi totali tra 6 giorni. I dati sono pero' incoraggianti perchè il modello sta sovrastimando nell'ultimo paio di giorni. Dovremmo essere al picco dei decessi tra oggi, domani o dopodomani.

[†]Lo scopo della presente analisi è di fornire una fotografia dello stato *attuale* dell'epidemia COVID in Italia. Non è basata su modelli epidemiologici matematici, ma sull'analisi statistica (per lo piu' descrittiva) dei dati regionali resi disponibili dal Ministero.

[‡]Dipartimento di Economia, New York University. I dati verranno aggiornati giorno per giorno. Grazie a Stefano Olivari per numerosi suggerimenti. Vi prego di scusare eventuali errori e di segnalarli a francesco.furno@nyu.edu. Fonte dati: <https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/blob/master/dati-regioni/dpc-covid19-ita-regioni.csv>

2 Fotografia: Evoluzione dell'Epidemia


I dati giornalieri sono volatili: utilizzo quindi una tecnica statistica per separare il trend.¹ I trend di crescita percentuale di casi, decessi, ricoveri e ricoveri in terapia intensiva sono in miglioramento da giorni. I dati aggregati potrebbero mascherare differenze regionali.







Estrapolando linearmente il trend statistico, si vede che tutte le variabili suggeriscono un azzeramento dei tassi di crescita a breve. Questo vale anche per i dati su morti, ricoverati e ricoverati in terapia intensiva, che sono variabili piu' affidabili dei casi (perche' questi ultimi riflettono prevalentemente il numero di test).

¹Il trend è estratto con un filtro HP, parametro di smoothing uguale a 5.

Distribuzione dei decessi per regione:




2.1 Tamponi



I tamponi totali eseguiti sono in costante crescita.² Diversa è l'evoluzione del numero medio di tamponi effettuati per ogni caso positivo, in stabilizzazione dopo una continua discesa: segnale che la capacità di testare del sistema sanitario nazionale è al limite e di un cambiamento di strategia. E' naturale che questo risulti in una *sottostima* del numero effettivo dei positivi. Alta la percentuale di tamponi positivi.

²Si noti che i dati ufficiali contengono una misurazione dei test (o tamponi) totali eseguiti. Sembrerebbe che una stessa persona possa essere testata più volte.


2.2 Pressione su Terapie Intensive




Il pannello superiore della figura mostra il numero di pazienti in terapia intensiva, mentre il pannello inferiore divide questo numero per i posti totali di terapia intensiva al 16 marzo, regione per regione. Si noti che il numero di posti totali di terapia intensiva è in costante espansione, e questo spiega come sia possibile avere percentuali superiori al 100% nel pannello inferiore. Purtroppo, il dato sui posti totali di terapia intensiva disponibili non viene aggiornato quotidianamente.

3 Fotografia: Lombardia


Lombardia - Crescita Giornaliera dei Casi % (Aggiornamento:25-Mar-2020)




Lombardia - Crescita Giornaliera dei Decessi % (Aggiornamento:25-Mar-2020)




Lombardia - Crescita Giornaliera Ricoverati (No TI) % (Aggiornamento:25-Mar-2020)




Lombardia - Crescita Giornaliera TI % (Aggiornamento:25-Mar-2020)



Lombardia - Tamponi Giornalieri Eseguiti (Aggiornamento:25-Mar-2020)



Lombardia - Tamponi Giornalieri Positivi (%) (Aggiornamento:25-Mar-2020)




Trend in miglioramento in tutte le variabili principali. Tuttavia, il numero di tamponi positivi è estremamente alto: questo suggerisce una forte difficoltà del sistema a monitorare l'epidemia.

4 Stime

4.1 Stima Tasso di Letalità

Il tasso di letalità nei dati italiani è una variabile chiave per calcolare altre variabili importanti. La mia stima del tasso di letalità è basata sull'idea che, in caso di decesso, intercorrono in media 8 giorni tra sintomi e decesso (fonte ISS). È molto probabile però che la diagnosi si presenti con un paio di giorni di ritardo rispetto ai sintomi.




Sulla base di questa ipotesi, i decessi registrati oggi derivano in media dai casi di 6 giorni fa. Quindi:

$$\text{Letalità}_t = \frac{\text{Deceduti Totali}_t}{\text{Casi Totali}_{t-6}}$$

Il mio modo di calcolare il tasso di letalità si contrappone a una modalità utilizzata in molti mezzi di informazione.³ Il tasso di letalità standard (comunemente usato) viene definito come:

$$\text{Letalità}_t^{\text{standard}} = \frac{\text{Deceduti Totali}_t}{\text{Casi Totali}_t}$$



³Per essere precisi, quello che stimo è il tasso medio di letalità nei dati italiani dall'inizio della crisi fino a 6 giorni fa.


4.1.1 Scelta del numero di giorni tra diagnosi e decesso

Ritengo che il modo ‘standard’ di calcolare il tasso di letalità sia ingannevole se si applica *durante* l’epidemia. Questo perchè le fonti ministeriali ci dicono che intercorrono in media 8 giorni tra sintomi e decesso. Calcolare la letalità comparando i deceduti di oggi con i casi di oggi equivale ad assumere che il decesso avviene lo stesso giorno in cui avviene la diagnosi. Il mio ragionamento è supportato dal seguente studio epidemiologico: <https://academic.oup.com/aje/article/162/5/479/82647>.

E’ evidente quindi che bisogna comparare i deceduti ad oggi con i casi di k giorni passati, ma non é ovvio scegliere k . Scelgo di adottare $k = 6$ giorni in media tra il momento in cui viene diagnosticato il caso (e quindi venga conteggiato nei casi totali) e il momento in cui viene registrato il decesso, perchè ipotizzo due giorni tra la comparsa dei sintomi e la diagnosi (un giorno per eseguire il test e un giorno per avere i risultati). Ovviamente potrei sbagliarmi, ed è per questo ricorro a una procedura statistica. Eseguo la seguente regressione lineare per ogni valore del lag k :

$$\text{Deceduti Totali}_t = \alpha + \beta \cdot \text{Casi Totali}_{t-k} + \varepsilon$$


e scelgo il valore di k che massimizza la statistica R^2 , cioè l’abilità del regressore di prevedere la variabile dipendente nel campione. Ripeto l’esercizio regione per regione:



Ci sono significative differenze regionali, ma l’idea di fondo è che in media, il numero di giorni intercorsi tra diagnosi e decesso che massimizza la statistica R^2 è circa 6, confermando la mia ipotesi. Si noti che maggiore è il valore di k , maggiore è il tasso di letalità stimato, perchè si comparano i deceduti totali al tempo t con il numero di casi totali al tempo $t - k$ (che è per definizione inferiore al crescere di k). Il tasso di letalità ottenuto con il metodo standard (cioè con $k = 0$) è quindi sempre il minor tasso di letalità stimabile con i dati disponibili *durante* un’epidemia.

4.2 Letalità e Tamponi: Confronto tra Regioni

Per cercare di razionalizzare gli alti tassi di letalità italiani, comparo la mia stima del tasso di letalità a livello regionale con la propensione a testare a livello regionale, misurata come ‘tamponi totali’ diviso per ‘casi totali’ regione per regione. Ogni cerchio rappresenta una regione, e la grandezza del cerchio rappresenta il numero totale di casi in quella regione. Per assicurarmi che il risultato non sia indotto dal mio metodo di stima della letalità, ripeto l’esercizio anche con la misura standard di letalità (deceduti oggi diviso per casi oggi).



La figura mostra che il tasso di letalità è più elevato nelle regioni che hanno una propensione a testare minore. L’ipotesi naturale è che quando si testa di meno, si testano casi più gravi e non si testano i casi meno gravi, quindi il tasso di letalità sale. Inoltre, le regioni con più casi (rappresentato da un cerchio più grande), sono quelle che testano di meno (probabilmente in maniera strategica per preservare risorse sanitarie, ma forse anche perché faticano a stare al passo con l’epidemia).

Tuttavia, si noti che la bassa propensione a testare è solamente uno dei fattori che potrebbe spiegare l’elevato tasso di letalità dei dati italiani. Infatti la statistica R^2 ci dice - in termini grezzi - che la differente propensione a testare spiega una frazione (che negli ultimi giorni oscilla tra il 20% e il 30%) della differente letalità tra regioni.

4.3 Stima Casi Effettivi

I tassi di letalità presenti nei dati del ministero sono eccezionalmente piu' alti dei tassi di letalità suggeriti sia dalla Cina sia dal rapporto dell'Imperial College di Ferguson et al., riportati nella tabella sottostante e applicati alla struttura demografica italiana.

Fascia Età	Letalità % (Dati Cina)	Letalità % (Dati Ferguson et al)	Popolazione Italiana %
0-9	0,00	0,00	8,43
10-19	0,20	0,01	9,56
20-29	0,20	0,03	10,27
30-39	0,20	0,08	11,72
40-49	0,40	0,15	15,31
50-59	1,30	0,60	15,49
60-69	3,60	2,20	12,16
70-79	8,00	5,10	9,88
80+	14,80	9,30	7,17

Data la struttura demografica italiana, i tassi di letalità 'teorici' dovrebbero essere per l'Italia: 2.62% (dati cinesi), 1.57% (dati Ferguson et al.).

Ipotizzando una *distribuzione uniforme dei contagi tra fasce d'età* e ipotizzando che la *vera letalità in Italia coincida con questi valori*, posso stimare quindi il numero di casi totali effettivi in Italia e regione per regione che sarebbero necessari a generare il tasso di letalità teorico.⁴ Infatti:

$$\text{Letalità teorica} = \frac{\text{Deceduti}_t}{\text{Casi Effettivi}_{t-6}}, \quad \text{Letalità dati italiani} = \frac{\text{Deceduti}_t}{\text{Casi Rilevati}_{t-6}}$$



Abbiamo quindi che

$$\frac{\text{Letalità dati italiani}}{\text{Letalità teorica}} = \frac{\text{Casi Effettivi}_t}{\text{Casi Rilevati}_t}$$

per ogni valore di t , e che si possono stimare i casi effettivi come segue:



$$\text{Casi Effettivi}_t = \text{Casi Rilevati}_t \times \frac{\text{Letalità dati italiani}}{\text{Letalità teorica}}$$

⁴Purtroppo, l'ipotesi di contagio uniforme tra fasce d'età non è verificabile. Guardare i casi rilevati dal sistema sanitario per fascia d'età non è informativo al riguardo poichè il testing non è casuale, ma selettivo (si privilegia test in soggetti piu' gravi, che tendono ad essere piu' anziani.).






Si noti che, maggiore il tasso di letalità italiano stimato, maggiore il numero dei casi effettivi. Quindi, il numero di casi effettivi varia enormemente se si usa il tasso di letalità standard o quello da me stimato. Difendo la mia scelta di stimare il tasso di letalità comparando i decessi ad oggi con i casi di 6 giorni fa sulla base di: 1) informazioni del Ministero; 2) selezione attraverso procedura statistica.




Ripeto però per completezza l'esercizio usando i tassi di letalità ottenuti con il metodo standard (deceduti oggi diviso per casi oggi):



Poichè il tasso di letalità calcolato con il metodo 'standard' è sempre il minor tasso di letalità stimabile, ne risulta che i casi effettivi stimati con esso siano il *limite inferiore* dei casi effettivi. In altre parole, il numero di casi effettivi è sempre *superiore* alla stima riportata nella figura sopra.

Le stime regione per regione che seguono sono ottenute utilizzando la mia stima del tasso di letalità:






Dividere per la popolazione aiuta a capire quali sono le regioni piu' colpite, tenendo conto che alcuni regioni sono piu' grandi (in termini di popolazione residente) di altre. è importante affiancare al numero totale dei casi, il numero totale dei casi diviso per la popolazione della regione.⁵

⁵I grafici rappresentano la percentuale di popolazione infettata dall'inizio della crisi ad oggi. Quest'ultima è data da casi totali rilevati divisi per la popolazione residente (blu), casi totali effettivi stimati (con la letalità cinese) divisi per popolazione (arancio), casi totali effettivi stimati (con la letalità di Ferguson et al.) divisi per popolazione (giallo).

4.4 Decessi


4.5 Validazione

Se la stima dei tassi di letalità è corretta, dovrei essere in grado di fornire una previsione corretta dei decessi a 6 giorni. Per prima cosa, mi limito ai dati disponibili 6 giorni fa e provo a prevedere i decessi negli ultimi 6 giorni. La figura sottostante riporta la stima aggregata, mentre le stime regionali sono in Appendice.



4.6 Previsione Prossimi 6 Giorni


Sulla base di casi ad oggi, è possibile prevedere il numero di decessi totali per i prossimi 6 giorni.⁶ Le previsioni sono piu' precise a livello nazionale e per regioni con molti casi, ma meno accurate per regioni con pochi casi.




⁶Si noti che questa è piu' simile a una *nowcast* che a una *forecast*: $\text{Deceduti}_{t+k} = \text{Casi}_t \times \text{Tasso Letalita}$. La mia previsione sovrastima il dato attuale quando la mia stima del tasso di letalità è maggiore di quello effettivo, e sottostima quando è inferiore a quello effettivo.

Appendice


Evoluzione Casi - Regioni




Evoluzione Deceduti - Regioni



Evoluzione Tamponi per Caso - Regioni




Evoluzione Tamponi Giornalieri - Regioni




Evoluzione Tamponi Giornalieri Positivi - Regioni


Lo strano comportamento del grafico è dovuta ai dati ufficiali: ci sono giorni in cui il numero di nuovi tamponi o casi è negativo, e ci sono giorni in cui il numero di nuovi casi supera il numero dei nuovi tamponi.



Evoluzione Tasso di Letalità Stimato - Regioni



Previsione Decessi - Validazione - Regioni



Previsione Decessi - Prossimi 6 Giorni - Regioni

